





## Blütenkalender: Nahrungspflanzen für Wildbienen WB / Schmetterlinge SL/ Schwebfliegen SF







Wildpflanzen und Kulturpflanzen, geeignet für den urbanen Raum, insbesondere Balkon = Ba und Garten = Ga.







Die Blüten sind alle auch für Honigbienen geeignet. Nektar N und Pollen P: 1 = gut / 4 = sehr gut.







Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versucht einen guten Querschnitt für Balkon und Garten aufzuzeigen.






### Blühbeginn ab Februar - März:

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Anemone / Buschwindröschen <i>Anemone nemorosa hort.</i>  Ranunculaceae	Aufgrund des frühen Blütetermins wichtige Pflanze für blütenabhängige Insekten	Februar – April	 Stauden / halbschattig	N: 0 P: 1	Ga	Weiß	Wildpflanze und Kulturformen. Geeignete Unterpflanzung unter Sträuchern.
Gänseblümchen <i>Bellis perennis</i>  Asteraceae  Ungefüllte Kultursorten	WB	Februar bis November	 Stauden, Wiesenpflanze / sonnig	N: 1 P: 1	Ga Wiesen	Weiß bis rosa	Heilpflanze Wildpflanze
Hirtentäschel <i>Capsella bursa pastoris</i>  Brassicaceae	WB / SF	Februar – November	 Wildkraut / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Wiese	Weiß	Wildpflanze
Huflattich <i>Tussilago farfara</i>  Asteraceae	WB / SL Aufgrund der frühen Blüte wichtige Erstlingsnahrung für Bienen und Hummeln, sowie überwinternder Tagfalter wie Zitronenfalter, Kleiner Fuchss, Tagpfauenauge.	Februar – Mai je nach Wetter	 Krautige mehrjährige Stauden / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 3	Ga	Gelb	Raupen-Futterpflanze: Blutbär  Samen sind Vogelfutter für Finken







Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Kornelkirsche <i>Cornus mas</i>  Cornaceae	WB / SL	Februar - März	 Strauch bis Baum / sonnig	N: 3 P: 2	Ga Park	Gelb	Früchte sind Vogelfutter.
Krokus / Frühlingskrokus <i>Crocus vernus</i>  Iridaceae	WB / SL  Frühe Mauerbienen Hummeln	Februar – März	 Zwiebelpflanze /sonnig	N: 3 P: 2	Ga	Diverse Kultursorten und Farben	
Schneeglöckchen <i>Galanthus nivalis</i>  Amaryllidaceae	WB / SL Hummel	Februar – April	 Krautige Knollenpflanze / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 2	Ga	Weiß	
Sternmieren-Arten <i>Stellaria spec.</i> <i>Stellaria hollostea</i>  Caryophyllaceae	WB / SL	Februar – Oktober	 Mehrjährige krautige Pflanzen / sonnig	N: 2 P: 1	Ga	Weiß	Wildpflanzen
Winterling <i>Eranthis hyemalis</i>  Ranunculaceae	WB  Frühe Mauerbienen Hummeln Schwebfliegen Fliegen	Februar - März	 Mehrjährige Knollenpflanze / halbschattig bis sonnig	N: 2 P: 3	Ga	gelb	Gebüschsäume
Blaukissen <i>Aubrieta spec.</i>  Brassicaceae	WB	März – Mai	 Polsterstaude / sonnig	N: 2 P: 1	Ba Ga	Lila, blauviolett, Purpur oder Weiß, je nach Sorte	



Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Blaustern / Zweiblättriger Blaustern <i>Scilla bifolia</i> + Sibirischer Blaustern <i>Scilla sibirica</i>  Liliaceae	WB	März – April	 Zwiebelpflanze / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 3	Ga	Blau	
Gundermann <i>Glechoma hederacea</i>  Lamiaceae	WB / SF Hummeln	März – April	 Staude, Bodendecker / halb- schattig	N: 1 P: 1	Ba Ga	Blauviolett	Wildpflanze Heilpflanze Guter Bodendecker unter Sträu- chern.
Kuhschelle <i>Pulsatilla spec.</i>  Ranunculaceae	WB / SL	März – April	 Staude / sonnig bis halb- schattig	N: 2 P: 3	Ga	Diverse Kul- tursorten und Farben.	
Lein / Flachs <i>Linum usitatissimum</i> als Nutz- pflanze <i>Linum perenne</i> als Zierpflanze  Linaceae	WB / SF Viele kleinere Wildbienen-Arten	März - August	 Einjährig, bzw. mehrjährig / sonnig	N: 1 P: 1	Ba Ga Feld	Blau Auch rote Sor- ten	Lein / Flachs ist eine Nutzpflanze für Lein-Öl, Leinsamen und eine Faserpflanze für Leinen-Stoffe.
Lerchensporn <i>Corydalis spec.</i>  Fumariaceae	WB	März – Mai	 Staude / halbschattig	N: 1 P: 1	Ga	Violett, rosa oder Weiß	
Lungenkraut <i>Pulmonaria officinalis</i>  Boraginaceae	WB / SL / SF	März - Mai	 Staude / halbschattig	N: 2 P: 2	Ga	Blau	







Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Primel / Kissenprimeln Ungefüllte Sorten <i>Primula vulgaris</i>  Primulaceae	WB	März – April	 Stauden / sonnig	N: 1 P: 1	Ba Ga	Diverse Sorten	
Rosmarin <i>Rosmarinus officinalis</i>  Lamiaceae	WB Bienen Hummeln Nachtfalter	März – Mai	 Halbstrauch / sonnig, nicht winterhart	N: 3 P: 1	Ba Ga	Blau	Heil- und Gewürzstrauch
Scharbockskraut <i>Ranunculus ficaria</i>  Ranunculaceae	WB / SF	März – Mai	 Stauden / halbschattig	N: 1 P: 1	Ga Obstgärten	Gelb	Mehrjährige Wildpflanze. Auwälder, Mischwälder, Hecken.
Scheinquitte / Zierquitte <i>Chaenomeles japonica</i>  Rosaceae	WB Hummeln	März - April	 Kleiner Strauch / Sonnig	N: 1 P: 1	Ga	Rot	
Schlüsselblume <i>Primula veris</i>  Primulaceae	WB / SL	März – Mai	 Stauden / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 1	Ba Ga	Gelb	Wildpflanze und Zierformen. Heilpflanze. Raupen-Futterpflanze: Schlüsselblumen-Würfelfalter
Schlüsselblume <i>Primula eliator hybr.</i>  Primulaceae	WB / SL	März – Mai	 Stauden / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 1	Ba Ga	Gelb	

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Schneestolz <i>Chionodoxa spec.</i>  Hyacinthaceae	WB Mauerbienen, Hummel	März – April	 Knollenpflanze, sonnig bis halbschattig	N: 1 P: 1	Ga	Blau	
Taubnesseln <i>Lamium album</i> + <i>Lamium purpureum</i> + Goldnessel <i>Lamium galeobdolon</i>  Lamiaceae	WB Hummeln	März – Oktober	 Stauden / sonnig	N: 1 P: 1	Ba Ga	Weiß, gelb oder Rosa	Wildpflanzen und z.T. Kulturfor- men.
Traubenhyazinthe <i>Muscari armeniacum</i>  Liliaceae	WB Mauerbienen, Hummeln	März – April	 Knollenpflanze / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 2	Ba Ga	Blau	
Weide / Sal-Weide <i>Salix caprea</i> und andere Weiden-Arten  Salicaceae	WB / SL / SF Hummeln	März - April	 Baum / feuchte Standorte	N: 4 P: 4	Park	grünlich	Blätter sind Raupen-Futter- pflanze: Abendpfauenaug C-Falter Trauermantel Großer Fuchs Großer Schillerfalter
Christrose / Nieswurz <i>Helleborus niger</i> <i>Helleborus foetidus</i>  Ranunculaceae	WB	Dezember - März	 Staupe / halbschattig	N: 2 P: 3	Ga	Weiß-grün	Wildpflanzen und Kulturformen.



## Blühbeginn ab April

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Apfelbaum / Kultur-Apfel <i>Malus domestica</i> var. + Zieräpfel <i>Malus multiflora</i>  Rosaceae	WB / SF Mauerbienen Furchenbienen Erd- und Sandbienen Hummeln	April – Mai je nach Sorte	 Baum / sonnig	N: 4 P: 4	Ga Obstwie- sen	Weiß-rosa	Bestäubung ist zweihäusig. D.h. die Fluginsekten müssen ver- schiedene Apfelbäume anfliegen, ansonsten findet keine Bestäu- bung statt.
Bärlauch <i>Allium ursinum</i>  Alliaceae	WB / SF	April – Juni	 Zwiebelpflanze / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 1	Ga	Weiß	Gewürzpflanze. Guter Bodendecker unter Sträu- chern.
Birnbaum <i>Pyrus communis</i> var.  Rosaceae	WB / SF Mauerbienen Furchenbienen Erd- und Sandbienen Hummeln	April – Mai je nach Sorte	 Baum / sonnig	N: 2 P: 3	Ga Obstwie- sen	Weiß	
Johannisbeere / Blut-Johan- nisbeere <i>Ribes sanguineum</i>  Grossulariaceae	WB / SL	April – Mai	 Zierstrauch / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Parks	Rosa-Töne	
Johannisbeeren <i>Ribes rubrum</i> + <i>Ribes nigrum</i>  Grossulariaceae	WB Erd- und Sandbie- nen u.a. Goldbiene	April – Mai	 Obststrauch / sonniger nährstoffreicher Standort	N: 2 / 3 P: 2 / 1	Ga Obstgar- ten	Gelbgrün	Obstgehölz
Kirschen / Süß-, Sauer- und Zierkirschen <i>Prunus spec.</i>  Rosaceae	WB / SF	April – Mai Wetter- und Sortenabhängig	 Baum / sonnig	N: 4 P: 4	Ga Obstwie- sen Parks	Weiß	



Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Kirschpflaume Ungefüllte Sorten <i>Prunus cerasifera</i>  Rosaceae	WB / SL	April - Mai	 Baum / sonnig	N: 2 P: 3	Ga Parks	Weiß oder Rosa	
Lichtnelke / Rote Lichtnelke <i>Silene dioica</i>  Caryophyllaceae	WB / SL / SF Hummeln	April – September	 Stauden / sonnig	N: 1 P: 1	Ba Ga	Rosa bis rot	Die weißen Lichtnelken-Arten werden eher von Nachtfaltern angefliegen.
Löwenzahn <i>Taraxacum officinale</i>  Asteraceae	WB	April – Mai	 krautige Stauden / sonnig, nährstoffreiche Böden	N: 3 P: 4	Ga Wiesen Weiden	gelb	Wildpflanze. Heilpflanze. Raupen-Futterpflanze: Gammaeule Achateule Hausmutter u.v.a. Vogelfutterpflanze Stieglitze u.a.
Mahonie <i>Mahonia aquifolium</i>  Berberidaceae	WB / SF Viele Hautflügler- Arten Schwebfliegen	April bis Mai	 Strauch, sonnig	N: 2 P: 3	Ga Parks	Gelb	Früchte sind Vogelfutter
Phlox / Polsterphlox <i>Phlox subulata</i>  Polemoniaceae	WB / SL	April – Mai	 Stauden / sonnig	N: 2 P: 2	Ga	Diverse Sor- ten-Farben	
Pflaumen und Mirabellen <i>Prunus spec.</i>  Rosaceae	WB / SL	April - Mai	 Obstbaum / sonnig	N: 4 P: 4	Ga Obstwie- sen	Weiß	Einige Schmetterlinge saugen auch an dem vergorenen Obst z.B. Admiral






Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Rose / Bibernelle <i>Rosa pimpinellifolia</i> / Syn. <i>Rosa spinosissima</i>  Rosaceae	WB / SF	April – Mai	 Strauch / sonnig	N: 1 P: 1	Ga	Weiß	Bildet schwarze Hagebutten.
Salbei / Wiesensalbei <i>Salvia pratensis</i>  Lamiaceae	WB	April – August	 Stauden / sonnig	N: 2 P: 1	Ba Ga Fettwie- sen	Blau	Raupen-Futterpflanze Kleines Nachtpfauenauge Gammaeule Purpurbär u.a.
Schlehe / Schwarzdorn <i>Prunus spinosa</i>  Rosaceae	WB / SL /	April – Mai	 Großer Strauch / Sonnig	N: 3 P: 2	Ga Parks	Weiß	Früchte sind auch Vogelfutter. Raupenfutterpflanze für mind. 43 Spanner-, Widderchen und Eulen- arten. u.a. Trauerwidderchen Kleines Nachtpfauenauge Gelbes Ordensband
Spitz-Wegerich <i>Plantago lanceolata</i> + <i>Plantago media</i> + <i>Plantago major</i>  Plantaginaceae	WB / SL / SF	April – September	 Stauden / sonnig bis halb- schattig	N: 0 P: 3	Ga Wiesen Wegrän- der	Grün	Spitzwegerich gehört zu den Heil- pflanzen. Raupen-Futterpflanze: Wegerichbär Großer Sackträger Gewöhnlicher Scheckenfalter Zimtbar Purpurbär u.a.
Stachelbeere <i>Ribes uva-crispa</i>  Grossulariaceae	WB Erd- und Sandbie- nen u.a. Goldbiene	April – Mai	 Obststrauch / sonnig	N: 3 P: 1	Ga Obstgar- ten	Grünlich-röt- lich	Obstgehölz
Sumpfdotterblume <i>Caltha palustris</i>  Ranunculaceae	WB / SF	April – Juni	 Stauden / feuchte bis nasse Standorte	N: 3 P: 2	Ga Park Sumpf- wiesen, Ufer, Gräben	Gelb	Auch als Kulturpflanze für Natur- Gartenteiche.















Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Taubnessel <i>Lamium maculatum</i>  Lamiaceae	WB Hummeln	April - Oktober	 Staude / sonnig bis halbschattig	N: 3 P: 2	Ga	Rot bis violett	Wildpflanze. Guter Bodendecker unter Sträuchern.
Vergissmeinnicht-Arten <i>Myosotis spec.</i> + <i>Myosotis sylvatica</i> + <i>Myosotis arvensis</i>  Auch Gartenformen. Boraginaceae	WB / SL / SF	April – Juni	 Ein- bis zweijährig / sonnig. Selbstaussaaten möglich.	N: 1 P: 1	Ba Ga	Hellblau	







### Blühbeginn ab Mai

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Akelei, ungefüllte Sorten <i>Aquilegia vulgaris</i>  Ranunculaceae  Diverse Kulturformen.	WB Hummeln	Mai – Juli	 Krautige Staude / sonnig bis halbschattig	N: 3 P: 1	Ga	Weiß, rosa, blau	Auch die Samenstände sind ein Gartenschmuck.
Beinwell <i>Symphytum officinale</i>  Auch Gartenformen Boraginaceae	WB / SL Hummeln	Mai - Juli	 Staude / Sonnig bis halbschattig, nährstoffreich	N: 3 P: 1	Ga	Rosa	Wildpflanze. Heilpflanze.






<p>Brombeere <i>Rubus sect.</i> mit ca. 300 Unterarten</p> <p>Und als Kulturpflanze <i>Rubus fruticosus</i></p> <p>Rosaceae</p>	WB / SL / SF	Mai – August	 <p>Strauch / Nährstoffreicher Boden, sonnig bis halbschattig</p>	N: 3 P: 3	Ga Obstgärten	Weiß bis Rosa	<p>Wild- und Obstgehölz-Arten. Früchte sind auch Vogelfutter. Raupen-Futterpflanze: Brombeer-Perlmutterfalter Roseneule Achat-Eulenspinner u.a. Futterpflanze für Beerenwanzen-Arten.</p>
<p>Geißblatt / wohlriechendes Geißblatt / Jelängerjelieber <i>Lonicera caprifolium</i></p> <p>+ Heckenkirsche <i>Lonicera xylosteum</i></p>	WB / SL Hummeln Nachtfalter	Mai - Juli	 <p>Rankengewächs / sonnig bis halbschattig</p>	N: 2 P: 1	Ga Parks	Weiß / Gelb	
<p>Giersch / Geißfuß <i>Aegopodium podagraria</i></p> <p>Apiaceae</p>	WB / SF / Viele chwebfliegenarten, diverse Käferarten, Schmalbauwespen usw.	Mai – Juli	 <p>Staude / halbschattig, bestandsbildend</p>	N: 1 P: 1	Ga Waldränder	Weiß	Die großen tellerartigen Blüten der Doldenblütler bieten gute Beobachtungsmöglichkeiten, da hier die Insekten länger verweilen und sich langsamer bewegen.
<p>Ginster / Besenginster <i>Cytisus scoparius</i></p> <p>Fabaceae</p>	WB	Mai – Juni	 <p>Zwergstrauch / sonnig</p>	N: 0 P: 3	Ga	Gelb	
<p>Glockenblumen-Arten <i>Campanula persicifolia</i> <i>Campanula porschaskyana</i> <i>Campanula rapunculoides</i> <i>Campanula glomerata</i> <i>Campanula trachelium</i> <i>Campanula patula</i> <i>Campanula media</i></p> <p>Campanulaceae</p>	WB / Mind. 3 spezialisierte Wildbienenarten ( <i>oligolektisch</i> ) Hummeln	Mai - September	 <p>Ein- und mehrjährige Arten / sonnig bis halbschattig</p>	N: 2 P: 2	Ba Ga	Blau	Diverse Wild- und Kulturformen.






Günsel / kriechender Günsel <i>Ajuga reptans</i>  Lamiaceae	WB / SL Mauerbienen Hummeln Tagfalter	Mai – Juli	 Staude, Bodendecker / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 1	Ba Ga	Blau	Guter Bodendecker unter Sträuchern.
Hahnenfuß / kriechender Hahnenfuß <i>Ranunculus repens</i>  Ranunculaceae	WB / SF Dickkopffliegen	Mai - August	 Kriechende Staude / sonnig	N: 1 P: 1	Ga Weiden	Gelb	Wildpflanze.
Hahnenfuß, Scharfer und andere gelbe Arten <i>Ranunculus acris</i> und <i>Ranunculus spec.</i>  Ranunculaceae	WB / SF Mauerbienen Furchenbienen Erd- und Sandbienen Viele Schwebfliegen-Arten	Mai – September	 Einjährig bis mehrjährig / sonnig	N: 1 P: 2	Ga Wiesen Weiden	Gelb	Wildpflanze.  Hahnenfuß-Scherenbiene <i>Chelostoma (Osmia) florissome</i> spezialisiert auf Hahnenfuß ( <i>Ranunculus</i> ) ( <i>oligolektisch</i> )
Hartriegel-Arten <i>u.a. Cornus sanguinea</i>	WB / SF	Mai – Juni	 Strauch oder kleiner Baum / sonnig	N: 1 P: 1	Ga Parks Vogelschutzhecken	Weiß	Vogelfutterpflanze  Raupen-Futterpflanze: Grüner Zipfelfalter Garten- oder Faulbaumbläuling
Himbeere <i>Rubus idaeus</i>  Rosaceae	WB / SL	Mai – Juli  Späte Sorten im August	 Strauch / sonnig bis halbschattig	N: 4 P: 3	Ga Obstgarten	Weiß	Obst- und Wildgehölz
Hornklee <i>Lotus corniculatus</i>  Fabaceae	WB Hummeln	Mai – August	 Krautige Staude / sonnig	N: 3 P: 1	Ga Wiesen	Gelb Fett- und Magerwiesen	Raupen-Futterpflanze: Esparsetten-Widderchen Sechsfleck-Widderchen Dunkler Dickkopffalter Argusbläuling Hauhechelbläuling Braune Tageule u.a.







Klee / Weiß-Klee <i>Trifolium repens</i>  Fabaceae	WB Hummeln	Mai – Oktober	 Staude / sonnig	N: 4 P: 4	Ga Wiesen	Weiß	Luzerne-Sägehornbiene <i>Melitta leporina</i> spezialisiert auf Schmetterlingsblütler ( <i>oligolektisch</i> )
Labkraut, Echtes <i>Galium verum</i>  Rubiaceae	WB / SL / SF	Mai – September	 Staude / Sonnig, trocken bis mäßig feucht.	N: 2 P: 2	Ba Ga Wiesen	Gelb	Raupen-Futterpflanze: Taubenschwänzchen Labkrautschwärmer Kleiner Weinschwärmer Labkrautbär Fleckenbär
Mohn / Klatschmohn <i>Papaver rhoeas</i> u.a. Papaveraceae	WB Furchenbienen Hummeln	Mai - Juli	 Einjährig / sonnig	N: 0 P: 3	Ga Acker- rand- streifen	Rot	Samen sind auch Meisenfutter. Die Mohn-Mauerbiene tapeziert mit den Blütenblättern die Niströhren. Wild-Mohnarten sind Ackerbegleitpflanzen, sie benötigen die entsprechenden Bodenbearbeitungen.
Mohn / Türkischer Mohn / Feuermohn <i>Papaver orientale</i> Papaveraceae	WB Furchenbienen Hummeln	Mai – Juni	 Staude / sonnig	N: 0 P: 2	Ga	Rosa bis rot	Zierpflanze. Samen sind auch Meisenfutter.
Pfingstrose / nur ungefüllte Sorten <i>Paeonia spec.</i>  Diverse Kulturformen. Paeoniaceae	WB Insbesondere Hummeln	Mai – Juni	 Staude / sonnig bis halbschattig	N: 1 P: 1	Ga Parks	Rot bis Rosa	
Saat-Esparette / Futter-Esparette <i>Onobrychis vicifolia</i>  Fabaceae	WB / SL Hummeln	Mai – Juli	 Staude, kurzjährig / sonnig	N: 4 P: 4	Ba Ga Wiesen Acker	Rosa	Angebaute, nahrhafte Futterpflanze für Vieh. Raupen-Futterpflanze: Esparetten-widderchen Kleines Fünffleck-Widderchen u.a.

Saat-Leindotter <i>Camellina sativa</i>  Brassicaceae	WB / SF	Mai - Juni	 Einjährig / Sonnig	N: 2 P: 0	Ga Acker Ruderal- stellen	Gelb	Selten angebaute Nutzpflanze für Öl.
Schnittlauch <i>Allium schoenoprasum</i>  Alliaceae	WB / SL Hummeln	Mai – August	 Zwiebelpflanze / sonnig	N: 3 P: 2	Ba Ga	Violett	Gewürzpflanze. Der Rückschnitt nach der Blüte fördert den Neuaustrieb.
Silberblatt, Wildes <i>Lunaria rediviva</i>  Als einjährige Gartenform auch <i>Lunaria annua</i>  Brassicaceae	WB / SL / SF	Mai – Juni	 Ein- bis zweijährig / sonnig bis halbschattig	N: 1 P: 1	Ga Parks	Weiß und blaue Formen	Raupen-Futterpflanze: Aurorafalter Grünader-Weißling
Stinkender Storchschnabel / Ruprechtskraut <i>Geranium robertianum</i>  Geraniaceae	WB / SF	Mai – Oktober	 Ein- bis mehrjährig / halbschattig bis schattig	N: 2 P: 2	Ga	Rosaviolett	Wildpflanze. Wächst gut unter Sträuchern.
Weißdorn <i>Crataegus monogyna</i> und <i>Crataegus laevigata</i>  Rosaceae	WB	Mai – Juni	 Baum / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Park	Weiß	
Wiesenknopf, Kleiner <i>Sanguisorba minor</i>  Rosaceae	WB / SL	Mai – Juni	 Stauden / sonnig	N: 2 P: 2	Ba Ga	Rot	Auch als Gewürzpflanze unter dem Namen Pimpinelle bekannt. Raupen-Futterpflanze: Roter Würfel-Dickkopf Kleiner Würfel-Dickkopffalter







## Blühbeginn ab Juni





Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Acker-Witwenblume <i>Knautia arvensis</i>  Caprifoliaceae	WB / SL	Juni – August	 Staude / sonnig	N: 3 P: 2	Ga	Blauviolett	Wildpflanze und Kulturformen.
Baldrian, Kleiner <i>Valeriana dioica</i> und Arzneibaldrian <i>Valeriana officinalis</i>  Dipsacaceae	WB / SL / SF	Juni – August	 Staude / sonnige, feuchte Standorte	N: 3 P: 1	Ga Feucht- wiesen Uferläufe	Weiß-rosa	
Bärenklau / Wiesenbärenklau <i>Heracleum sphondylium</i>  Apiaceae	WB / SL / SF Frühe Doldensand- biene ( <i>oligolektisch auf Doldenblütler</i> ) Sehr viele Schwebfliegenarten und kurzrüsselige Bienen	Juni - September	 Staude / sonnig bis halb- schattig 30 -50cm	N: 2 P: 1	Ga Wald- randwie- sen	Weiß	Die großen tellerartigen Blüten der Doldenblütler bieten gute Be- obachtungsmöglichkeiten, da hier die Insekten länger verweilen und sich langsamer bewegen.
Bienenfreund / Büschelschön <i>Phacelia tanacetifolia</i>  Boraginaceae	WB / SL / SF Hummeln Viele Schmetterligs- Arten	Juni – September	 Einjährig / sonnig	N: 4 P: 3	Ga	violett	Blüht zur Flugzeit vieler Hummel- Jungköniginnen und wird daher von diesen stark frequentiert, da der Nektarertrag sehr hoch ist.  Eignet sich als Gründüngung.
Blutweiderich <i>Lythrum salicaria</i>  Lythraceae	WB / SL / SF Furchenbienen Hummeln	Juni - September	 Staude / Sonnig bis halb- schattig,	N: 3 P: 3	Ga Feucht- wiesen- pflanze	Rosa	Raupen-Futterpflanze: Mittlerer Weinschwärmer Garten- oder Faulbaumbläuling






Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Borretsch <i>Borago officinale</i>  Scrophulariaceae	WB Hummeln	Juni – September	 Einjährig, sonnig / neigt zur Selbstversamung	N: 4 P: 2	Ga	blau	Blüht zur Flugzeit vieler Hummel- Jungköniginnen und wird daher von diesen stark frequentiert, da der Nektarertrag gut ist.
Färberkamille <i>Anthemis tinctoria</i>  Asteraceae	WB / SL / SF Erd- und Sandbie- nen Maskenbienen Mauerbienen Viele Schwebflie- gen-Arten	Juni – September	 Ein- bis mehrjährig / sonnig, nährstoffarm	N: 2 P: 1	Ba Ga	Gelb	Gute Trockenmauerpflanze
Fingerhut / Roter Fingerhut <i>Digitalis purpurea</i> <i>u.a.</i>  Scrophulariaceae	WB / SL Hummeln	Juni - August	 Zweijährig / sonnig bis halb- schattig	N: 3 P: 1	Ga Waldrän- der.	Rosa bis Rot	Wildpflanze. Giftpflanze. Heilpflanze.
Fingerkraut / Strauch-Finger- kraut <i>Potentilla fruticosa</i>  Rosaceae	WB / SL	Juni – September	 Halbstrauch / sonnig	N: 1 P: 1	Ga Parks	Gelb oder weiß	
Flockenblume / Wiesenflo- ckenblume <i>Centaurea jacea</i> und Skabiosen-Flockenblume <i>Centaurea scabiosa</i> Asteraceae	WB / SL / SF Viele Käferarten	Juni - Oktober	 Stauden / sonnig	N: 3 P: 2	Ga	Violett	Raupen-Futterpflanze: Flockenblumen-Scheckenfalter Gewöhnlicher Scheckenfalter <i>u.a.</i>  Vogelfutterpflanze für Finken






Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Gemeine Schafgarbe / Wiesenschafgarbe <i>Achillea millefolia</i>  Asteraceae	WB / SF Viele kurzrüsselige Insektenarten	Juni – September	 Stauden / sonnig bis halbschattig	N: 1 P: 1	Ba Ga	Weiß Als Garten- pflanzen u.a. auch als gelb- blühende Goldgarbe	Heilpflanze. Raupen-Futterpflanze: Herbstspinner Alpen-Dickleibspanner Wolfsmilch-Rindeneule Englischer Bär
Gilbweiderich-Sorten <i>Lysimachia vulgaris</i> + <i>Lysimachia punctata</i>  Primulaceae	WB Spezialisierte Schenkelbienen- Arten Gattung Macropis	Juni – August	 Stauden / sonnig bis halb- schattig, feuchte Böden	N: 0 P: 1 Öle: 2	Ga	Gelb	Die Pflanzen liefern Öle anstelle von Nektar. Das ist für einige spezialisierte Bienenarten wichtig.
Hauhechel / Dornige Hauhechel <i>Ononis spinosa</i>  Fabaceae	WB Hummeln Platterbsen-Mörtel- biene <i>Megachile ericetorum</i>	Juni - August	 Halbstrauch / sonnig	N: 1 P: 1	Ga	violett	Wildpflanze und Kulturformen.
Herzgespann <i>Leonorus cardiaca</i> + <i>Leonorus sibiricus</i>  Lamiaceae	WB Wollbienen, Hummeln u.a.	Juni - September	 Stauden /sonnig, 150-180cm	N: 2 P: 1	Ga	Rosa	Alte Heilpflanze. Geeignet neben Trockenmauern oder in Kräuterspiralen.
Johanniskraut <i>Hypericum perforatum</i> u.a.  Hypericaceae	WB / SF	Juni - Septem- ber	 Stauden / Sonnig	N: 1 P: 3	Ba Ga	gelb	
Jungfernebe / Wilder Wein <i>Parthenocissus spec.</i>  Vitaceae	WB Diverse Insektenar- ten	Juni – Juli	 Mehrjährige Rankpflanze / sonnig bis halbschattig	N: 3 P: 3	Ga	Grünlich-gelb	Als Rankpflanze an Mauern bietet sie bestimmten Singvogelarten die Möglichkeit zum Nestbau. Früchte sind Vogelfutter.  Fassadenbegrünung.














Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Kamille <i>Matricaria chamomilla</i>  Asteraceae	WB	Juni – September	 Einjährige Pflanze / sonnig	N: 1 P: 1	Ga Acker- ränder	Weiß	Wildpflanze. Heilpflanze. Ackerbegleitpflanze.
Kapuzinerkresse <i>Tropaeolum majus</i>  Brassicaceae	WB Hummeln	Juni – September	 Einjährig / sonnig	N: 2 P: 2	Ba Ga	Rot	Raupen-Futterpflanze: Kleiner Kohlweißling Großer Kohlweißling Somit geeignet zur Ablenkung von angebautem Gemüse-Kohl.
Katzenminze <i>Nepeta cataria</i> <i>Nepeta x fassanii</i>  Lamiaceae	WB / SL Bienen Hummeln Tag- und Nachtfal- ter	Juni - September	 Staude / sonnig	N: 3 P: 1	Ba Ga	Violett	
Klee / Rotklee <i>Trifolium pratense</i>  Fabaceae	WB Hummeln Spezialisiert: Luzerne-Sägehorn- biene <i>Melitta lepo- rina</i>	Juni - September	 Staude / sonnig	N: 3 P: 3	Ga Wiesen	Rosa - hellrot	Auch als Futterpflanze und Bo- denverbesserer angebaut.  Raupen-Futterpflanze: Rotklee-Bläuling Gammaeule Braune Tageule
Kornblume <i>Centaurea cyanus</i>  Asteraceae	WB / SL / SF	Juni – September	 Einjährig / sonnig	N: 3 P: 3	Ga Acker- rand- streifen	Blau	Wildpflanze. Wild-Arten sind Ackerbegleit- pflanzen, sie benötigen die ent- sprechenden Bodenbearbeitun- gen. Samen sind Vogelfutter. Kultivierte Formen in Parks und Gärten sind oft nicht samenfest.
Lavendel <i>Lavendula angustifolia</i>  Lamiaceae	WB / SL / SF Bienen Hummeln Tag- und Nachtfal- ter Schwebfliegen	Juni – August	 Halbstrauch / sonnig, nährstoffarm, trocken	N: 4 P: 2	Ba Ga	Violett	Blüht zur Flugzeit vieler Hummel- Jungköniginnen und wird daher von diesen stark frequentiert, da der Nektarertrag sehr hoch ist.







Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Leinkraut <i>Linaria vulgaris</i>  Als Gartenform auch Purpur- Leinkraut <i>Linaria purpurea</i>  Scrophulariaceae	WB Furchenbienen Hummeln	Juni – September	 Staude / sonnig	N: 2 P: 1	Ga Unkraut- fluren	Gelb	Wild- und Kulturformen.
Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>  Oleaceae	WB / SL / SF	Juni – Juli	 Baum oder Strauch / sonnig	N: 2 P: 2	Ga	Weiß mit Ho- nigduft	Als Solitärstrauch/Baum oder als Heckenpflanze geeignet.
Luzerne / Saat-Luzerne <i>Medicago sativa</i>  Fabaceae	WB / SL / Hummeln Luzerne-Sägehorn- biene <i>Melitta leporina</i> spezialisiert auf Schmetterlingsblüt- ler ( <i>oligolektisch</i> )	Juni – September	 Staude / sonnig	N: 3 P: 1	Ba Ga	Blau	Als Kulturpflanze auch feldmäßig angebaut. Nahrhaftes Futter für Vieh. Raupen-Futterpflanze: Garten- oder Faulbaumbläuling Hauchel-Bläuling Gammaeule u.a.
Mädesüß, Echtes / Große Spierstaude <i>Filipendula ulmaria</i>  Rosaceae	WB Viele Insektenarten	Juni – August	 Staude / sonnig bis halb- schattig, feuchte Standorte	N: 0 P: 3	Ga Bach- Ufer- pflanze	Weiß	Enthält nach Mandeln duftende ätherische Öle. Ehemals als Bier- würze und in der Volksmedizin als Rheumapflanze genutzt. -- Raupen-Futterpflanze: Alpiner Ringelspinner Kleines Nachtpfauenauge Kleiner Würfeldickkopf Mädesüß-Perlmutterfalter Zimtbär Brauner Bär Schönbär




Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Malve / Moschusmalve <i>Malva moschata</i> Auch Gartenformen  Malvaceae	WB / SF Wespenbienen Hummeln u.a. Käferarten	Juni – August	 Einjährig bis mehrjährig / sonnig	N: 2 P: 1	Ba Ga Magerrasen	Rosa	Raupen-Futterpflanze: Distelfalter Malven-Dickkopffalter  Feuerwanzen fressen den reich- lich vorhandenen Samen gern.
Malve / wilde Malve <i>Malva sylvestris</i> <i>Malva neglecta</i>  Malvaceae	WB / SL / SF	Juni – September	 Ein- bis mehrjährig / sonnig, trockene Standorte	N: 3 P: 1	Ba Ga Wiesen	Rosa	Raupen-Futterpflanze: Malven-Dickkopffalter
Mariendistel <i>Silybum marianum</i>  Asteraceae	WB / SL	Juni – August	 Zweijährig / sonnig	N: 3 P: 3	Ga	Violett	Heilpflanze
Mauerpfeffer, Scharfer <i>Sedum acre</i> + Goldfetthenne <i>Sedum aizoon</i> Crassulaceae	WB / SL / SF	Juni - August	 Staude / sonnig, Mauern, Sandtrockenrasen	N: 3 P: 2	Ba Ga	Gelb	Trockenmauerpflanze
Mauerpfeffer, Weißer / Weiße Fetthenne <i>Sedum album</i>  Crassulaceae	WB / SL / SF	Juni – September	 Staude / sonnig, Mauern, Sandtrockenrasen	N: 3 P: 2	Ba Ga	Weiß	Trockenmauerpflanze. Einziges Raupen-Futterpflanze des seltenen Apollo-Falters.

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Melisse / Zitronenmelisse <i>Melissa officinalis</i>  Lamiaceae	WB / SL	Juni – Juli	 Staude / sonnig bis halbschattig	N: 2 P: 2	Ba Ga	Weiß	Gewürz- und Heilpflanze.
Minzen <i>Mentha spec.</i> u.a. Pfefferminze <i>Mentha x piperita</i>  Lamiaceae	WB / SL / SF	Juni - Juli	 Staude / sonnig bis halb- schattig, feuchte Standorte	N: 3 P: 2	Ba Ga	Weiß	Diverse Wild- und Kulturformen. Gewürz- und Heilpflanze.
Möhre / Wilde Möhre <i>Daucus carota</i>  Apiaceae	WB / SF Kleine Wildbienen u.a. Sandbienen Schwebfleigen Grabwespen, Schmalbauwespen, diverse Käferarten u.a.	Juni bis September im 2. Jahr.	 Zweijährig / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Wiesen	Weiß	Insektenmagnet. Die großen tellerartigen Blüten der Doldenblütler bieten gute Be- obachtungsmöglichkeiten, da hier die Insekten länger verweilen und sich langsamer bewegen.
Nachtkerze <i>Oenothera biennis</i>  Onagraceae	WB / SL / SF Nektarquelle für viele Nachtfalter- Arten.	Juni – September	 Zweijährig / sonnig	N: 1 P: 1	Ga Ruderal- flächen	Gelb	Raupen-Futterpflanze: Nachtkerzen-Schwärmer Mittlerer Wein-Schwärmer
Natternkopf <i>Echium vulgare</i>  Boraginaceae	WB / SL Spezialist: Glän- zende Natternkopf- Mauerbiene. Viele Schmetterlings- Arten	Juni – August Im 2. Jahr	 Zweijährig / sonnig	N: 3 P: 2	Ga Wegrän- der	Blau	Sonnige Unkrautfluren. Raupen-Futterpflanze: Messingeule Russischer Bär



Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Odermennig <i>Agrimonia eupatoria</i>  Rosaceae	WB / SF Viele Insektenarten	Juni – September	 Stauden / sonnig bis halbschattig	N: 0 P: 1	Ga Wegrän- der	Gelb	Raupen-Futterpflanze: Kleiner Würfeldickkopf
Platterbse <i>Lathyrus latifolius</i> + <i>Lathyrus pratensis</i>  Fabaceae	WB Insbesondere spezialisierte Blattschneider und Mörtelbienen, Hummeln	Juni – August	 Ein- mehrjährige Arten / sonnig	N: 1 P: 1	Ga	Rosa	Die Blüten besitzen einen kompli- zierten Bestäubungsmechani- smus, der nur von Wildbienen aus- gelöst werden kann.  Raupen-Futterpflanze: Platterbsen-Widderchen Kleines Fünffleck-Widderchen Kleespinner Schmalflügel-Weißling Braune Tageule
Resede-Sorten <i>Reseda spec.</i> <i>Reseda luteola</i> + <i>Reseda lutea</i> + <i>Reseda odorata</i> Resedaceae	WB Maskenbienen Erd- und Sandbienen Hummeln Solitäre Faltenwes- pen u.a.	Juni - September	 zwei- bis mehrjährige Arten / sonnig	N: 1 P: 2	Ga Feld	Gelb	Reseden-Maskenbiene <i>Hylaeus signatus</i> streng spezialisiert auf <i>Reseda</i> ( <i>oligolektisch</i> )
Rettich / Radieschen <i>Raphanus sativus</i> und andere blühende Rettich-Arten samenfester Sorten.  Brassicaceae	WB / SF	Juni – August	 Einjährig / sonnig	N: 2 P: 1	Ga Gemüse- Garten	Weiß	Im blühenden Zustand gute In- sektenpflanze. Raupen-Futterpflanze: Kleiner Kohlweißling Und damit geeignet zur Ablen- kung von den Gemüsekohl-Arten.
Ringelblume <i>Calendula officinalis</i>  Asteraceae	WB / SL / SF	Juni - September	 Ein- bis Zweijährig / sonnig	N: 2 P: 2	Ba Ga	Gelb bis orange	Heilpflanze.

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Rosa / Hundrose <i>Rosa canina</i> und Essigrose <i>Rosa glauca</i>  Sowie weitere ungefüllte Rosen-Arten die Hagebutten ansetzen. z.B. <i>Rosa multiflora</i>  Rosaceae	WB / SF Rosenkäfer-Arten	Juni - Juli	  Strauch /sonnig	N: 0-1 P: 4	Ga Parks	Weiß bis Rosa-Tönungen  Rot	Heilpflanze. Hagebutten als Vogelfutter.
Salbei <i>Salvia officinalis</i> und andere Salbei-Arten z.B. Muskateller-Salbei Lamiaceae	WB / Hummeln	Juni – August	 Mehrjähriger Halbstrauch / sonnig, nährstoffarm	N: 3 P: 1	Ba Ga	Lila	Heilpflanze. Blüht zur Flugzeit vieler Hummel-Jungköniginnen und wird daher von diesen stark frequentiert, da der Nektarertrag gut ist.
Steinklee / gelber Steinklee <i>Melilotus officinalis</i>	WB / SL	Juni - September	 Einjährig / sonnig	N: 4 P: 4	Ga Unkrautfluren	Gelb	
Sterndolde <i>Astrantia major</i>  Apiaceae	WB / SF	Juni – September	 Staude / sonnig bis halbschattig	N: 1 P: 1	Ba Ga Parks	Weiß	
Tauben-Skabiose <i>Scabiosa columbaria</i>  Caprifoliaceae	WB / SL u.a. Widderchen	Juni – Oktober	 Staude / sonnig	N: 3 P: 3	Ba Ga	Blauviolett	Raupen-Futterpflanze Goldener Scheckenfalter Flockenbumen-Scheckenfalter







Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Thymian / Feld-Thymian <i>Thymus pulegoides</i> + <i>Thymus serpyllum</i>  Gewürz-Thymian <i>Thymus vulgaris</i> Lamiaceae	WB / SL	Juni – September	 Stauden / sonnig	N: 2 P: 1	Ba Ga Parks	Weiß oder rosa	
Vogelwicke <i>Vicia cracca</i>  Fabaceae	WB / SL	Juni – August	 Stauden / sonnig	N: 3 P: 2	Ga Wiesen Weiden Waldrän- der	Blau – violett	
Weidenröschen, Schmalblät- tiges <i>Epilobium angustifolium</i>  Onagraceae	WB / SL Insbesondere spezialisierte Arten	Juni - August	 Stauden / sonnig	N: 2 P: 1	Ga Gebü- sche, Waldrän- der	Rosa-violett	Raupenfutterpflanze: Nachtkerzenschwärmer Labkrautschwärmer Mittlerer Weinschwärmer
Weinraute <i>Ruta graveolens</i>  Gartenpflanze Rutaceae	WB / SF	Juni – August	 Stauden / sonnig	N: 2 P: 2	Ba Ga	Gelb	Gewürzpflanze. Raupen-Futterpflanze: Abendpfaueauge C-Falter u.a.
Weinrebe <i>Vitis vinifera</i>  Vitaceae	WB / SL / SF	Juni – August	 Strauch /sonnig	N: 2 P: 2	Ga Wein- berge	Grün	Seit mind. 2000 Jahren Nutz- pflanze für Wein- und Tafeltrau- ben. Früchte sind Vogelfutter.
Wiesenknopf, Großer <i>Sanguisorba officinalis</i>  Rosaceae	WB / SL / SF	Juni – Septem- ber	 Hohe Stauden 150-180cm / sonnig	N: 2 P: 2	Ga	Rot	Selten gewordene Wildpflanze. Auf Feuchtwiesen und am Rand von Gräben. Raupen-Futterpflanze: Dunkler Wiesenkopf-Ameisen- bläuling Mädesüß-Perlmutterfalter







Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Wiesen-Storchschnabel <i>Geranium pratense</i>  Geraniaceae	WB / SF	Juni – August	 Staude / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Feuchte Wiesen	Blau	
Winterheckezwiebeln <i>Allium fistulosum</i>  Alliaceae	WB / SL Hummeln	Juni – August	 Zwiebelpflanze /sonnig	N: 3 P: 2	Ba Ga	Gelb	Gemüsepflanze. Rückschnitt nach der Blüte fördert Neuaustrieb.
Wucherblume / Margerite <i>Leucanthemum vulgare</i>  Asteraceae	WB / SL / SF Maskenbienen Mauerbienen Erd- und Sandbienen Schwebfliegen Käferarten	Juni - Oktober	 Staude / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Wiesen	Weiß	Wild- und Kulturformen.



### Blühbeginn ab Juli

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Dill <i>Anethum graveolens</i>  Apiaceae	WB / SF	Juli – September	 Einjährig / sonnig	N: 3 P: 2	Ga	Weiß	Gewürz- und Heilpflanze. Samenfeste Sorten kann man zur Saatgutvermehrung in Blüte gehen lassen.
Dost / Oregano <i>Origanum vulgare</i>  Lamiaceae	WB / SL Bienen Hummeln Schmetterlinge	Juli - September	 Staude / Sonnig	N: 3 P: 2	Ba Ga	Rosa	






Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Fenchel <i>Foeniculum vulgare</i>  Apiaceae	WB / SL / SF	Juli – August	 Zweijährige oder ausdauernde krautige Pflanze / sonnig	N: 4 P: 2	Ga	Gelb	Gewürz- und Heilpflanze Raupenfutterpflanze: Schwalbenschwanz
Fetthenne, Prächtige <i>Sedum spectabile</i> + <i>Sedum telephium</i>  Crassulaceae	WB / SL / SF	Juli – September	 Staude / sonnig, trocken	N: 3 P: 2	Ga Parks	Rosa bis Rot	
Herbstlöwenzahn <i>Leontodon autumnale</i> Syn. <i>Scorzoneriodes autumnalis</i>  Asteraceae	WB / SL	Juli – Oktober	 Staude / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Wiesen	gelb	Samen sind Vogelfutter für Stieglitze.
Karde / Wilde Karde <i>Dipsacum fullonum</i>  Dipsaceae	WB / SL Hummeln Tag- und Nachtfalter	Juli – August	 Zweijährig / sonnig	N: 3 P: 1	Ga Ruderal- Flächen	Rosa	Fruchtstände mit den Samen sind Vogelfutter für Finken.
Königskerze <i>Verbascum densiflorum</i> + <i>Verbascum thapsus</i>  Scrophulariaceae	WB / SL Hummeln	Juli – September	 Zweijährig / sonnig	N: 1 P: 2	Ga Ruderal- gewächs	Gelb	Raupenfutterpflanze: Braunwurzmonch
Kratzdistel / Ackerkratzdistel <i>Cirsium arvense</i>  Asteraceae	WB / SL / SF Hummeln	Juli – Oktober	 Zwei- bis mehrjährig / sonnig, mäßig nährstoffreich	N: 2 P: 2	Ga Ruderal- flächen	Rosa	Raupen-Futterpflanze Distelfalter  Vogelfutterpflanze

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Kugeldistel / Honigdistel <i>Echinops ritro</i>  Asteraceae	WB / SL Hummeln	Juli - August	 Staude / sonnig	N: 3 P: 2	Ga	Lila	Blüht zur Flugzeit vieler Hummel- Jungköniginnen und wird daher von diesen stark frequentiert, da der Nektarertrag gut ist.
Phlox / Polsterphlox <i>Phlox paniculata</i>  Polemoniaceae	WB / SL	Juli – Septem- ber	 Staude / sonnig	N: 2 P: 2	Ga	Diverse Far- ben	
Schmetterlingsflieder <i>Buddleja davidii</i>  Scrophulariaceae	WB / SL Langrüsselige Bienen-Arten Viele Tagfalter- Arten	Juli – September	 Strauch / sonnig	N: 1 P: 1	Ga Parks	Violett – rosa	Diese Pflanze ernährt viele flie- gende Schmetterlinge, gehört je- doch nicht zu den Raupenfutter- pflanzen.
Sonnenblume <i>Helianthus annuus</i>  Asteraceae	WB	Juli - September	 Einjährig / sonnig, 60 - 120cm	N: 3 P: 3	Ba Ga	Gelb	Samen sind Vogelfutter.
Sonnenhut-Arten <i>Rudbeckia fulgida</i> + <i>Rudbeckia lacinata</i>  Asteraceae	WB / SF Löcherbienen Viele Schwebfliegen	Juli - Oktober	 Zwei- bis mehrjährige Arten / sonnig	N: 1 P: 1	Ba Ga Parks	Gelb	
Wasserdost / Kunigun- denkraut <i>Eupatorium cannabinum</i>  Asteraceae	WB / SL	Juli - September	 Staude / sonnig bis halbschattig, feuchter Boden	N: 1 P: 1	Ga	Rot-lila	

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Wegwarte <i>Cichorium intybus</i>  Asteraceae	WB / SL / SF	Juli – September	 Einjährig / sonnig	N: 2 P: 2	Ga Weg- und Acker- ränder	Blau	
Ysop <i>Hyssopus officinales</i>  Lamiaceae	WB Hummeln	Juli – Oktober	 Mehrjähriger Halbstrauch / sonnig	N: 4 P: 2	Ba Ga	blau	

### Blühbeginn ab August

Name:	WB / SL / SF	Blütezeit	Foto / Standort:	Nektar Pollen	Garten Balkon	Blüten-Farbe	Bemerkungen:
Aster / Glattblatt-Aster <i>Aster nova-belgii</i>  Asteraceae	WB / SL / SF	August - Oktober	 Stauden / sonnig	N: 2 P: 2	Ga	Weiß, blau, lila	
Aster / Rauhblatt-Aster <i>Aster novae-angliae</i>  Asteraceae	WB / SL / SF	August - Oktober	 Stauden / sonnig	N: 3 P: 3	Ga	Weiß / Violett- töne	
Efeu <i>Hedera helix</i>  Araliaceae	WB / SL / SF  Efeu-Seidenbiene ( <i>Colletes hederæ</i> ) ist spezialisiert auf Efeu	August - Okto- ber	 Mehrjähriges Rankengewächs / halbschattig	N: 3 P: 2	Ga Parks	gelbgrün	Samen: Vogelfutter Gehölz: Nistplatzmöglich- keit für Vögel

**Datenquellen und Literaturempfehlungen:**

NUA natur- und umweltschutz-akademie NRW

[www.die-Honigmacher.de](http://www.die-Honigmacher.de)

[www.trachtfließband.de](http://www.trachtfließband.de)

[www.wildbienen.de](http://www.wildbienen.de)

Empfohlene Literatur:

Bruno P. Kremer „Mein Garten – ein Bienenparadies“

Elke Schwarzer „Heimische Pflanzen für den Garten“

Heiko Bellmann „Der Kosmos Schmetterlingsführer“

u.a.